

希舒美 阿奇霉素干混悬剂

问题

希舒美干混悬剂在儿童患者中的用法用量？

答复



以阿奇霉素治疗儿童的任何感染时，建议其总剂量最高不超过 1500 mg。一般情况下，儿童的总剂量为 30 mg/kg。总剂量为 30 mg/kg，连续 3 天给药，每日给药一次，剂量为 10 mg/kg；或总剂量仍为 30 mg/kg，连续 5 天给药，每日给药一次，第一天 10 mg/kg，第 2 至第 5 天 5 mg/kg。对体重小于 15 kg 的儿童，服用阿奇霉素的剂量应尽量准确称量。对体重大于等于 15 kg 的儿童，阿奇霉素的服用方法如下表所示。¹

阿奇霉素干混悬剂的服用方法（总治疗剂量为 30 mg/kg）¹

体重	三日服用方法	五日服用方法
15 kg 以下	每日口服 10 mg/kg 体重一	

希舒美 阿奇霉素干混悬剂

	次，连续服用三天	
15 至 25 kg	每日口服 200 mg 一次，连续服用三天	首日口服 200 mg 一次，第 2 至第 5 天每日口服 100 mg 一次
26 至 35 kg	每日口服 300 mg 一次，连续服用三天	首日口服 300 mg 一次，第 2 至第 5 天每日口服 150 mg 一次
36 至 45 kg	每日口服 400 mg 一次，连续服用三天	首日口服 400 mg 一次，第 2 至第 5 天每日口服 200 mg 一次
>45 kg	服用方法及剂量同成人，即总剂量 1500 mg，每日口服 500 mg 一次，连续三天	服用方法及剂量同成人，即总剂量 1500 mg，首日服用 500 mg 一次，第 2 至第 5 天每日口服 250 mg 一次

注：本品每袋含阿奇霉素二水合物 104.81 mg，相当于阿奇霉素 100 mg。

希舒美 阿奇霉素干混悬剂



急性中耳炎：除“三日疗法”和“五日疗法”两种服药方案外，治疗儿童急性中耳炎时也可按 **30 mg/kg** 单剂量一次性服用。¹



链球菌性咽炎：治疗儿童链球菌性咽炎可按不同方案服药。对于儿童链球菌性咽炎，阿奇霉素单剂量 **10 mg/kg** 或 **20 mg/kg** 连续服药 **3** 天证实有效，然而每日用量不得超过 **500 mg**。¹



尚未确定阿奇霉素在治疗年龄不足 **6** 个月的急性中耳炎、急性细菌性鼻窦炎和社区获得性肺炎儿童患者时的安全性和有效性。根据在成人中开展的充分且良好对照的试验，阿奇霉素可用于治疗儿童患者（年满 **6** 个月）的急性细菌性鼻窦炎及社区获得性肺炎。尚未确定阿奇霉素在治疗未**满 2** 岁的咽炎/扁桃腺炎儿童患者时的安全性和有效性。¹

希舒美干混悬剂为处方药，医生在处方药品时，对药品的具体给药方法会结合说明书、患者个体情况和临床实践经验来综合决定，所以有些情况下可能会出现医生的

希舒美 阿奇霉素干混悬剂

处方与说明书推荐不一致的情况。在这种情况下，请您确保是在有医嘱的前提下使用。

更多信息

如何使用这些信息？

本文档未包含所有相关信息，此内容仅供参考，不能代替医疗卫生专业人士的建议，不应作为自我诊断和治疗的依据。在开始治疗前，您应与医疗卫生专业人士讨论治疗方案。由于他们可以获得您的病史以及所有治疗信息，因此最适合为您提供治疗建议。

哪里可以获取更多信息？

更多信息建议您参考该药品完整版说明书。

参考文献：

1希舒美（阿奇霉素干混悬剂）说明书。