

希舒美

阿奇霉素片/阿奇霉素干混悬剂/注射用阿奇霉素

问题

希舒美是否会对胎儿造成不良影响？

答复

从数十年来已发表的观察性研究、病例系列和病例报告中获得的现有数据并未提示孕妇使用阿奇霉素会使胎儿主要出生缺陷、流产或不良孕妇或胎儿结果的风险增加。然而这些数据具有局限性。^{1,2,3}

尚未在动物中进行阿奇霉素静脉输液产品的生殖和发育毒性的试验。³

妊娠大鼠和小鼠于器官生成期分别经口给予阿奇霉素最高至 200 mg/kg/天（中等母体毒性），未见导致胎仔畸形。以体表面积计，该剂量分别约为成人每日剂量 500 mg 的 4 倍（大鼠）和 2 倍（小鼠）。妊娠兔于器官生成期间经口给予阿奇霉素 10、20 和 40 mg/kg/天，在所有组中均可见母体体重减轻和摄食量减少；在这些剂量下（以体表面积计，最高剂量约为成人每日剂量 500 mg 的 2 倍），未见胎仔毒性或致畸性证据。^{1,2,3}

希舒美

阿奇霉素片/阿奇霉素干混悬剂/注射用阿奇霉素

希舒美是处方药，如您有治疗相关的问题，请咨询专科医生。

更多信息

如何使用这些信息？

本文档未包含所有相关信息，此内容仅供参考，不能代替医疗卫生专业人士的建议，不应作为自我诊断和治疗的依据。在开始治疗前，您应与医疗卫生专业人士讨论治疗方案。由于他们可以获得您的病史以及所有治疗信息，因此最适合为您提供治疗建议。

哪里可以获取更多信息？

更多信息建议您参考该药品完整版说明书。

若出现不良反应该怎么办？

若您出现不良反应，请及时联系您的医生或药师。这些不良反应也包括用药后可能出现且未列在说明书中的情况。您可以通过拨打热线电话 400 910 0055 或发送邮件至 ChinaMI@pfizer.com 报告不良反应。

参考文献：

- 1 希舒美（阿奇霉素片）说明书。
- 2 希舒美（阿奇霉素干混悬剂）说明书。
- 3 希舒美（注射用阿奇霉素）说明书。