希舒美
阿奇霉素片/阿奇霉素干混悬剂/注射用阿奇霉素

问题

希舒美为何使用效果不佳?

答复

经国家药品监督管理局批准的希舒美说明书中的适应症，其疗效经过国内外临床研究证实，在临床治愈率和微生物学治愈率方面，与传统治疗药物相比，疗效相当或优于，且耐受性良好。但是，由于患者的个体疾病状况不相同，药物治疗并不能保证 100%的患者均有效。如处方希舒美疗效不满意，建议患者咨询医生，由医生决定下一步治疗方案。

阿奇霉素片[1]及阿奇霉素干混悬剂[2]说明书【适应症】提及：

阿奇霉素是一种大环内酯类抗菌药物，适用于治疗由指定微生物敏感菌株在下列具体病症中引起的轻度至中度感染。

- 流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌或肺炎链球菌引起的慢性支气管炎细菌感染急性发作。

希舒美
阿奇霉素片/阿奇霉素干混悬剂/注射用阿奇霉素

- 肺炎衣原体、流感嗜血杆菌、肺炎支原体或肺炎链球菌引起的社区获得性肺炎。
- 流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌或肺炎链球菌引起的急性中耳炎。
- 流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌或肺炎链球菌引起的急性细菌性鼻窦炎。
- 化脓性链球菌引起的咽炎/扁桃腺炎。
- 金黄色葡萄球菌、化脓性链球菌或无乳链球菌引起的单纯性皮肤和皮肤结构感染。
- 沙眼衣原体或淋病奈瑟氏球菌引起的尿道炎和子宫颈炎。
- 杜克雷嗜血杆菌引起的男性生殖器溃疡病（软下疳）。由于临床试验招募的女性人数太少，因此尚未确定阿奇霉素治疗女性软下疳的疗效。

注射用阿奇霉素说明书[3]【适应症】提及：

阿奇霉素适用于敏感病原菌所致的下列感染，阿奇霉素治疗各种感染时推荐的剂量、疗程及适用患者人群不同。

社区获得性肺炎 由肺炎衣原体、流感嗜血杆菌、嗜肺军团菌、卡他莫拉菌、肺炎支原体、金黄色

希舒美
阿奇霉素片/阿奇霉素干混悬剂/注射用阿奇霉素

葡萄球菌或肺炎链球菌等病原菌所致，且起始治疗需静脉给药的患者。

盆腔炎性疾病 由沙眼衣原体、淋病奈瑟氏球菌或人型支原体所致，且起初治疗需静脉给药的患者。若怀疑可能合并厌氧菌感染者，需加用一种抗厌氧菌的药物与本品联合治疗。

希舒美是处方药，如您有治疗相关的问题，请咨询专科医生。

更多信息

如何使用这些信息?

本文档未包含所有相关信息，此内容仅供参考，不能代替医疗卫生专业人士的建议，不应作为自我诊断和治疗的依据。在开始治疗前，您应与医疗卫生专业人士讨论治疗方案。由于他们可以获取您的病史以及所有治疗信息，因此最适合为您提供治疗建议。

哪里可以获取更多信息?

更多信息建议您参考该药品完整版说明书。

若出现不良反应该怎么办?

若您出现不良反应，请及时联系您的医生或药师。这些不良反应也包括用药后可能出现且未列在说明书中的情况。您可以通过拨打热线电话 400 910 0055 或发送邮件至 ChinaMI@pfizer.com 报告不良反应。

参考文献:

1 希舒美（阿奇霉素片）说明书.
2 希舒美（阿奇霉素干混悬剂）说明书.
3 希舒美（注射用阿奇霉素）说明书