

希舒美

阿奇霉素片/阿奇霉素干混悬剂/注射用阿奇霉素

问题

希舒美的半衰期是多久？

答复

半衰期是血浆药物浓度下降一半所需要的时间。其长短可反映体内药物消除速度。¹

单剂量 500 mg 口服和静脉给药后，阿奇霉素的血浆浓度以多相的模式降低，平均表观血浆清除率为 630 ml/min，终末清除半衰期为 68 小时。一般认为终末半衰期延长是由于组织广泛摄取继之释放药物的原因。^{2,3,4}

更多信息

如何使用这些信息？

本文档未包含所有相关信息，此内容仅供参考，不能代替医疗卫生专业人士的建议，不应作为自我诊断和治疗的依据。在开始治疗前，您应与医疗卫生专业人士讨论治疗方案。由于他们可以获取您的病史以及所有治疗信息，因此最适合为您提供治疗建议。

哪里可以获取更多信息？

更多信息建议您参考该药品完整版说明书。

希舒美

阿奇霉素片/阿奇霉素干混悬剂/注射用阿奇霉素

参考文献:

- 1 杨宝峰.药理学第八版[M].北京人民卫生出版社:2013.
- 2 希舒美（阿奇霉素片）说明书.
- 3 希舒美（阿奇霉素干混悬剂）说明书.
- 4 希舒美（注射用阿奇霉素）说明书.