

希舒美

阿奇霉素干混悬剂

问题

儿童使用希舒美干混悬剂一天误服多次怎么办？

答复

儿童使用希舒美干混悬剂时，建议每天服用一次，不推荐每天多次服用。说明书中提到希舒美药物过量时患者发生的不良反应与推荐剂量的相似，尤其是恶心、腹泻和呕吐。¹如果您发现儿童一天多次误服了希舒美，请您及时带儿童到医院就诊，由医生评估儿童的情况，并由医生根据临床需要采取相应的治疗措施，比如一般对症措施和支持措施。

希舒美是处方药，如您有治疗相关的问题，请咨询专科医生。

更多信息

如何使用这些信息？

本文档未包含所有相关信息，此内容仅供参考，不能代替医疗卫生专业人士的建议，不应作为自我诊断和治疗的依据。在开始治

希舒美

阿奇霉素干混悬剂

疗前，您应与医疗卫生专业人士讨论治疗方案。由于他们可以获得您的病史以及所有治疗信息，因此最适合为您提供治疗建议。

哪里可以获取更多信息？

更多信息建议您参考该药品完整版说明书。

若出现不良反应该怎么办？

若您出现不良反应，请及时联系您的医生或药师。这些不良反应也包括用药后可能出现且未列在说明书中的情况。您可以通过拨打热线电话 400 910 0055 或发送邮件至 ChinaMI@pfizer.com 报告不良反应。

参考文献：

- 1 希舒美（阿奇霉素干混悬剂）说明书。