

PAXLOVID

奈玛特韦片/利托那韦片组合包装

问题

Paxlovid 常见不良反应有哪些？

答复

该药说明书中根据临床试验数据列出的常见（出现频率 $\geq 1/100$ 到 $< 1/10$ ）不良反应包括腹泻、呕吐、恶心和味觉倒错。¹

奈玛特韦/利托那韦（Paxlovid）是处方药，请在医生指导下使用。

对于您服用该药后是否会出现不良事件我们无法预估。建议您在医生指导下安全用药，如服药期间出现不适，请及时就医。

更多信息

如何使用这些信息？

本文档未包含所有相关信息，此内容仅供参考，不能代替医疗卫生专业人士的建议，不应作为自我诊断和治疗的依据。在开始治疗前，您应与医疗卫生专业人士讨论治疗方案。由于他们可以获取您的病史以及所有治疗信息，因此最适合为您提供治疗建议。

哪里可以获取更多信息？

更多信息建议您参考该药品完整版说明书。

PAXLOVID

奈玛特韦片/利托那韦片组合包装

若出现不良反应该怎么办？

若您出现不良反应，请及时联系您的医生或药师。这些不良反应也包括用药后可能出现且未列在说明书中的情况。您可以通过拨打热线电话 400 910 0055 或发送邮件至 ChinaMI@pfizer.com 报告不良反应。

参考文献：

- 1 奈玛特韦片/利托那韦片组合包装说明书