

希舒美

阿奇霉素片/阿奇霉素干混悬剂

问题

成人患者如何服用希舒美？

答复



阿奇霉素片和阿奇霉素干混悬剂需每日口服一次，与食物同服或不同服均可。^{1,2}阿奇霉素片需整片吞服。¹阿奇霉素干混悬剂需溶于水中，服用前搅拌均匀。²



对于说明书中所列微生物敏感菌株引起的轻度至中度慢性支气管炎细菌感染急性发作、社区获得性肺炎、急性中耳炎、急性细菌性鼻窦炎、咽炎/扁桃腺炎、单纯性皮肤和皮肤结构感染，成人患者可采用总剂量 1500 mg 的治疗方案，每日一次服用本品 500 mg 共三天，或总剂量相同，首日服用 500 mg，第二至第五日每日一次口服本品 250 mg。^{1,2}

对沙眼衣原体、杜克嗜血杆菌或敏感淋球菌所致的性传播疾病，仅需单次口服本品 1000 mg。^{1,2}

希舒美

阿奇霉素片/阿奇霉素干混悬剂



希舒美是处方药，如您有治疗相关的问题，请咨询专科医生。

更多信息

如何使用这些信息？

本文档未包含所有相关信息，此内容仅供参考，不能代替医疗卫生专业人士的建议，不应作为自我诊断和治疗的依据。在开始治疗前，您应与医疗卫生专业人士讨论治疗方案。由于他们可以获取您的病史以及所有治疗信息，因此最适合为您提供治疗建议。

哪里可以获取更多信息？

更多信息建议您参考该药品完整版说明书。

参考文献：

- 1 希舒美（阿奇霉素片）说明书。
- 2 希舒美（阿奇霉素干混悬剂）说明书。